



Aprenda Cómo Ayudar A Proteger A Su Bebé Contra La Bacteria Estreptococo del Grupo B (EGB) Ahora Que El Resultado de Su Prueba Es Positivo

Ser diagnosticada con EGB significa que usted "lleva" o esta "colonizada" con estreptococo del grupo B, una bacteria encontrada a menudo en el tracto digestivo y en la vagina de cada una en cuatro mujeres embarazadas. EGB es la mas común causa de meningitis, neumonía, y asepsia en recién nacidos en los estados unidos. Puede infectar a los bebes antes de nacer y hasta los seis meses de edad, causando muerte o desventajas de toda la vida.

Usted puede ayudar a proteger a su bebé contra EGB

...DURANTE SU EMBARAZO

- Pídale a su doctor para una muestra de la orina para detectar EGB o otra bacteria al menos durante el primer y tercer trimestre. *EGB en la orina pone a su bebe en mas alto riesgo. Antibióticos orales debieran ser recetados.*
- Consulte a su doctor si tiene síntomas de una infección vaginal por ejemplo, inflamación o picazón en la vagina o descarga rara.
- Evite innecesarios, enérgicos, o seguidos exámenes cervicales y arranque de la membrana o crema cervical para inducir el trabajo de parto. *Agresivos procedimientos pueden causar que EGB infecte a su bebe antes de que se le reviente la bolsa de agua.*
- Si es alérgica a la penicilina existen otras opciones de tratamiento, consulte a su doctor.
- Prepárese en adelanto si tiene cortos trabajos de parto o vive lejos del hospital. *Los antibióticos intravenosa que le dan durante el trabajo de parto necesitan cuatro horas para ser efectivas.*
- Si planea tener a su bebe por vía cesárea, pregúntele a su doctor que le administre los antibióticos por vía intravenosa cuatro horas antes de su incisión. *Teniendo a su bebe por vía cesárea no previene la infección EGB.*
- Consulte a su doctor sobre los monitores fetales para asegura que los beneficios contrapesen los riesgos. *La cortada en el cuero cabelludo puede permitir que entre EGB a la sangre de su bebe antes de que reciba los antibióticos por vía intravenosa por tan siquiera cuatro horas.*

... CUANDO SE LE REVIENTE LA BOLSA DE AGUA O COMIENZE EL TRABAJO DE PARTO

- Llame a su doctor. Déjele saber si tiene fiebre. Vaya al hospital inmediatamente para comenzar los antibióticos por vía intravenosa.
- Evite innecesarios, enérgicos, o seguidos exámenes cervicales durante el trabajo de parto hasta que haya tenido los antibióticos por vía intravenosa por tan siquiera cuatro horas. *Ultrasonidos vaginales podrían ser una alternativa.*

...DESPUÉS DE QUE NAZCA SU BEBE

- Si su bebe nace antes de que haya tenido los antibióticos por cuatro horas, el hospital tal vez observara y tomara muestras de su bebe por 48 horas. Usted le puede pedir a su doctor que le den antibióticos a su bebe mientras espera los resultados de la muestra.
- Unos hospitales le darán una inyección de penicilina una hora después de nacer para evitar más el riesgo de la infección EGB. Pregúntele a su doctor.
- Tienen que lavarse las manos completamente antes de tocar al bebe. *La infección EGB puede ser causada por otras personas no necesariamente solo la mama.*
- Amamantando puede ayudar a su bebe prevenir infecciones suministrando importantes anticuerpos.

SINTOMAS DE EGB QUE PUEDE MOSTRAR SU BEBE

Lleve a su bebe al cuarto de emergencia o llame a su doctor **inmediatamente** si nota cualquier de estos síntomas:

- Grito alto echado, chillón gimiendo, o lloriqueando
- Irritabilidad, llanto inconsolable
- Gruñidos como que estuviera estreñido
- Vómitos proyectiles
- No come bien o rechaza la comida
- Duerme demasiado y no se levanta para comer
- Alta o baja temperatura: las manos y los pies todavía se sienten fríos después de una fiebre
- La piel esta emborronada, roja, o delicada
- La piel esta azul, gris, o pálida porque su bebe no tiene suficiente oxígeno
- Rápido, lento, o dificultad al respirar
- El cuerpo se pone tieso, incontrolables movimientos
- Una pierna o brazo no tiene movimiento, o esta lánguida, o esta abatido
- Sitio tenso o prominente en la tapa de la cabeza
- Mirada vacía

Este documento es solamente para motivos informativos y no constituye para el consejo medico. Revisado septiembre 2006..

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISÍTENOS:
www.groupbstrepinternational.org

GROUP B STREP INTERNATIONAL
Correo Electrónico: info@gbs-intl.org
Tel: 508.273.7247 (el este de los EEUU)
909.620.7214 (el oeste de los EEUU)
Fax: 909.620.5557

